

Antidolorifici dopo l'intervento chirurgico

Queste informazioni hanno lo scopo di accompagnare la prescrizione o la fornitura di medicinali per alleviare il dolore dopo l'intervento chirurgico. Fare riferimento alla prescrizione o all'etichetta per istruzioni specifiche.

Dolore dopo l'intervento chirurgico

È normale avere un pò di dolore dopo l'intervento chirurgico. Potrebbe essere necessario assumere alcuni medicinali per controllare e alleviare il dolore dopo l'intervento chirurgico.

Questi medicinali aiuteranno a ridurre il dolore e consentiranno di tornare più rapidamente alle normali attività.

Quali medicinali possono aiutare?

Dopo l'intervento il medico valuterà quali antidolorifici sono più adatti a te. Alcuni dei medicinali che potrebbero essere somministrati includono:

- Paracetamolo
- Medicinali anti infiammatori (come ibuprofen o diclofenac)
- Tramadol
- Medicinali oppioidi (come Endone[®], Oxycontin[®] o Targin[®])

Come prendere la medicina del dolore

Prendi la tua medicina del dolore come indicato. Non assumere più della dose raccomandata.

Se consigliato dal medico, utilizza una combinazione di antidolorifici. Ciò può ottenere un migliore sollievo dal dolore, con meno effetti collaterali, rispetto a una grande dose di un singolo medicinale.

Alcuni medicinali antidolorifici ti verranno prescritti per l'assunzione regolare. Potrebbe anche essere prescritto un medicinale da usare 'secondo necessità' quando si verificano più dolori.

Se dimentichi di prendere una dose di medicinale, salta quella dose e prendi la dose successiva come al solito. Non prendere una dose doppia per recuperare.

Effetti collaterali

Alcuni degli effetti collaterali che potrai provare includono nausea, vomito, costipazione e sonnolenza. Se avverti sonnolenza non guidare la macchina e non operare macchinari.

Contatta il tuo medico se:

- non riesci a dormire per il dolore
- il dolore aumenta piuttosto che diminuire
- il dolore non migliora dopo aver preso i medicinali antidolorifici
- stai provando effetti collaterali causati dai medicinali antidolorifici
- prendi accidentalmente troppi medicinali antidolorifici

Interrompere la medicina del dolore

Chiedi al medico per quanto tempo devi prendere l'antidolorifico.

Gradualmente smetti di assumere i tuoi farmaci per il controllo del dolore. Quando il dolore è migliorato e non è più necessario il medicinale antidolorifico 'secondo necessità', è possibile interrompere gradualmente l'assunzione dei normali farmaci antidolorifici.

Medicine rimanenti

Dopo esserti completamente ripreso dall'intervento, porta tutti gli antidolorifici rimasti alla farmacia locale per uno smaltimento sicuro.

I farmaci antidolorifici devono essere assunti solo su consiglio medico. Non somministrare le medicine a parenti o amici, anche se presentano gli stessi sintomi.

Pain medicines after surgery

This information is intended to accompany prescription or supply of medicines for pain relief after surgery. Please refer to prescription or label for specific instructions.

Pain after surgery

It is normal to have some pain after surgery. You may need to take some medicines to control and relieve pain after surgery.

These medicines will help with reducing your pain and allowing you to get back to your usual activities more quickly.

Which medicines can help?

After your surgery your doctor will assess which pain medicines are most suitable for you. Some of the medicines you might be given include:

- Paracetamol
- Anti-inflammatory medicines (such as ibuprofen or diclofenac)
- Tramadol
- Opioid medicines (such as Endone[®], Oxycontin[®] or Targin[®])

How to take your pain medicines

Take your pain medicines as directed. Do not take more than the recommended dose.

When advised by your doctor use a combination of pain medicines. This can achieve better pain relief, with fewer side effects, than a large dose of a single medicine.

Some pain medicines will be prescribed for you to take regularly. You may also be prescribed a medicine to use 'as needed' when you are experiencing more pain.

If you forget to take a dose of medicine, skip that dose and take the next dose as usual. Do not take a double dose to catch up.

Side effects

Some of the side effects you may experience include nausea, vomiting, constipation and drowsiness. Do not drive a motor vehicle or operate machinery if you experience drowsiness.

Contact your local doctor if:

- you are unable to sleep because of pain
- your pain is increasing rather than improving
- your pain doesn't get better after taking your pain relief medicine
- you are experiencing side effects from your pain relief medicine
- you accidentally take too much pain relief medicine

Stopping your pain medicines

Ask your doctor about how long to take your pain medicines.

Stop taking your regular pain control medicines gradually. When your pain has improved and you no longer require your 'as needed' pain relief medicine, you can gradually stop taking your regular pain-relief medicines.

Leftover medicines

Once you have fully recovered from your surgery, take any leftover pain medicines to your local pharmacy for safe disposal.

Pain relief medicines should only be taken on medical advice. Do not give your medicines to relatives or friends, even if they have the same symptoms.